

Bergen op Zoom, April 2026

Gras-klover & de mogelijkheden van ProClova

Gras-klover is een belangrijk onderdeel van de ruwvoerteelt op veel bedrijven. Klover bindt stikstof uit de lucht en verhoogt de voederwaarde van uw ruwvoer. Om dit potentieel volledig te benutten, is een effectieve onkruidbestrijding essentieel zonder de klover te verliezen. Met de komst van ProClova is dit nu beter mogelijk. ProClova is een uniek, klaversparend herbicide die breedbladige onkruiden effectief aanpakt. ProClova heeft een duidelijk bredere en vaak ook sterkere werking dan de bestaande middelen in gras-klover.



Toepassing onder groeizame omstandigheden

Voor een goede werking op onkruiden en zo goed mogelijke veiligheid voor klover is het volgende van belang → [Toepassen onder groeizame omstandigheden wordt sterk aanbevolen](#). Wanneer de gras-klover en de onkruiden goed aan de groei zijn dan zorgt dit voor een goede bestrijding van de onkruiden en een zo gering mogelijke groeiremming van het gras en de klover. [Spuut wanneer de nachttemperatuur gedurende enkele dagen boven de 7°C blijft voor een optimale werking en vlot herstel van het gewas](#).

Eind deze week lijken er goede weersomstandigheden te zijn voor de toepassing van ProClova.

Muur


We zien momenteel al flink ontwikkelde muurplanten in de gras-klover weiden. Kleine muur van max een cm of 5 is nog gevoelig voor ProClova. Grotere muur zal niet volledig worden bestreden. (Eventueel Basagran toevoegen is dan een optie) Alternatief is eerst maaien. Na de maaisnede zien we meestal dat muur onderdrukt wordt door het gras.

Kleine veldkers

We krijgen momenteel geregeld de vraag of ProClova ook tegen kleine veldkers werkt. Uit ervaringen in België weten we intussen dat kleine veldkers zeer gevoelig is voor ProClova!

Enkele verdere aandachtspunten:

- ProClova kan toegepast worden vanaf dat de klaver drie samengestelde bladeren heeft (zie foto hiernaast). Na toepassing zal er tijdelijke vervorming of groeiremming bij de klaver optreden. De klaver herstelt zich volledig na een of twee snedes of begrazingsrondes.
- Rode klaver is gevoeliger en zal zich moeilijker herstellen dan de witte klaver.
- Bij toepassing na beweiden/maaien: Zorg voor voldoende hergroei van de onkruiden alvorens de bespuiting uit te voeren.
- Na de bespuiting moet minimaal 7 dagen worden gewacht met beweiden en/of maaien (de veiligheidstermijn). Voor zuring is 10-14 dagen wachter beter.



ADVIES

- **Bestaand grasland = 125 gr/ha ProClova + 0,25 L/ha veresterde koolzaadolie**
- **Nw ingezaaid grasland = 85 gr/ha ProClova + 0,15 L/ha veresterde koolzaadolie**
- *Op percelen niet-grenzend aan oppervlaktewater geldt de standaard DRT van 75%*
- *Op percelen langs oppervlaktewater is gebruik van DRT95 verplicht. Bij toepassing van de volle dosering van 125 gram & perceel langs oppervlaktewater geldt er bovendien een spuitvrije zone van 175 cm.*

Met vriendelijke groet,
Corteva Agriscience Benelux