

AgroForum

maart 2020

Grootfruit: vruchtverbetering met Aminosol

Aminosol is een product bestaande uit aminozuren. Met behulp van enzymen worden dierlijke eiwitten gehydrolyseerd waardoor deze aminozuren ontstaan. Al vele jaren wordt Aminosol ingezet in het fruit ten behoeve van de vruchtverbetering. Aminosol is erg zacht en geeft geen verruwing.

ADVIES: Peer	Dikkere peren / vruchtaantal / vruchtgrootte / opbrengst	Ballonstadium 7,5 l/ha + in de afbloei 7,5 l/ha.
Kers	Beperking van de rui	Einde van de bloei 7,5 l/ha + na 10 dagen nogmaals 7,5 l/ha.
Appel	Vruchtaantal / verruwing / vruchtgrootte / opbrengst	Roze knop 7,5 l/ha + ballonstadium 7,5 l/ha. In appel is deze toepassing minder effectief dan in peer of kers. Alleen onder slechte omstandigheden uitvoeren.

Appel: start calciumprogramma direct na de bloei met Caltrac ZB

Om voldoende calcium in de vruchten te krijgen is het belangrijk om al vroeg tijdens de celdeling zo veel mogelijk calcium te geven. Op het moment van celdeling wordt calcium nog in de vruchten getransporteerd. Later niet meer. Caltrac ZB is hoog geconcentreerde en dermate gewasveilig dat het in een hoge dosering gespoten kan worden.

ADVIES: 5 l/ha Caltrac ZB in de periode tussen bloei en junirui.

Nieuw: Lebocal Hepta, calciumbladmeststof ook inzetbaar in bio fruit

We hebben de samenstelling van ons product Lebocal gewijzigd waardoor het nu ook inzetbaar is in de bio-teelten. De basis van calciumchloride met Aminosol past ook in de biologische fruitteelt. In de oude formulering waren de mangaan en zink in nitraatvorm. Door deze te wijzigen in heptachelaten is het nu ook geschikt voor biologische teelten. De nieuwe naam is Lebocal Hepta en de adviesdoseringen blijven exact hetzelfde.

ADVIES: 5 – 8 l/ha in fruitteelt in de periode tussen bloei en junirui.

Calciumprogramma bloembollen voor inwendige kwaliteit

Het spuiten van Caltrac ZB zorgt ervoor dat de calciumopname vanuit de bodem niet wordt verstoord. Verdamping zorgt voor calciumopname vanuit de bodem en zodra deze "calciumpomp" een keer stopt komt hij niet meer op gang. Calcium zorgt voor de inwendige kwaliteit van de bol.

ADVIES: Bloembollen: 5 l/ha Caltrac ZB net voor het koppen. Na koppen 2 x 2 l/ha met een interval van 14 dagen.

Ijzerbemesting met Ferritrac 54 in diverse teelten

Bodemtoepassing met Ferritrac 54 werkt uitermate goed. Omdat Ferritrac vloeibaar is, is het zeer makkelijk in gebruik. Omdat chelaat afbreekt door zonlicht altijd toepassing tijdens een regenbui of direct inregenen. Het toevoegen van Humifirst of soortgelijk product verbetert de opname.

ADVIES: Bloembollen:	10 tot 30 l/ha
Peer:	10 tot 40 l/ha op de zwartstrook
Aardbeien:	10-15 l/ha
Boomkwekerij:	4-5 ml/m ² behandelde oppervlakte

ProNet-Alfa, de zachtste uitvloeier

Deze uitvloeier-hechter is ontzettend zacht en geeft goede resultaten in o.a. de fruitteelt. Let erop dat dit een natuurlijk product is en dat aangebroken cans opgemaakt worden voor de oogst. Na een winter overblijven is de werking beduidend minder.

ADVIES: 100-200 ml per 100 liter spuitvloeistof