

De merrie maakt het veulen



Een goed veulen uit je merrie fokken is lang niet eenvoudig. Uiteraard heb je een goede merrie nodig. Daarna volgt de moeilijke zoektocht naar een geschikte hengst. Uiteindelijk doe je een flinke investering, om de merrie dragend te krijgen. Als dit eenmaal gelukt is, wil je natuurlijk te allen tijde ervoor zorgen dat het veulen gezond en sterk op de wereld komt. Goede voeding voor de merrie is daarom essentieel. Wil je geen risico nemen? Voer dan op tijd voldoende Ferto-LAC 3 merriebrok bij. Voor het beste resultaat wordt aangeraden om deze brok de laatste 3 à 4 maanden van de dracht te voeren (aangezien in deze periode van de dracht de grootste groei plaatsvindt) tot aan het spenen van het veulen.

Voeding tijdens dracht

Drachtige en zogende merries moeten niet alleen zichzelf onderhouden maar dragen daarnaast ook de verantwoording over de eerste ontwikkelingen van het veulen. Goede voeding is dus van groot belang in deze periode. Ook is tijdens de gehele dracht een goede conditie belangrijk. Beste is wanneer de ribben op haar flank niet zichtbaar zijn maar wel gemakkelijk te voelen. Fokmerries hebben een sterk verhoogde behoefte aan energie en hoogwaardige eiwitten.



HAVENS producten zijn met de juiste kennis samengesteld zodat uw veulen qua voeding optimaal voorzien wordt met de juiste voedingsstoffen en geen risico loopt op de vorming van OCD.

Ook de drie botmineralen (Calcium, Fosfor en Magnesium) zijn van groot belang. Eveneens is de behoefte aan Vitamine A verhoogd, daar veulens zonder Vitamine A reserve geboren worden. Deze moet dus via de moedermelk verstrekt worden. Na 6 maanden dracht neemt de groei van het ongebooren veulen sterk toe. De voergift moet dus ook omhoog. De merrie krijgt een flink hogere eiwitbehoefte - dit zijn immers de bouwstenen van het lichaam.

OCD

Een optimaal kopergehalte is belangrijk voor een goede ontwikkeling van het beendergestel. De kans op OCD wordt hierdoor verkleind. Men moet zich daarbij wel realiseren dat teveel koper niet beter is, maar juist averechts kan werken. Een teveel aan koper kan de opname van andere spoorelementen verlagen. De koperbehoefte van een 500 kg wegende merrie aan het einde van de dracht is 120 mg. Bij 3,5 kg Ferto-LAC 3 is deze behoefte ruim gedekt.

De Ferto-LAC 3 bevat tevens Multi-Calcium-Complex: Het MCC zorgt voor een 3-voudige Calcium voorziening voor een optimale doorgift van de belangrijkste botmineralen van het veulen. De Ferto-LAC 3 bevat tevens extra toegevoegde vloeibare essentiële aminozuren voor een goede ontwikkeling van de vrucht, optimale groei van spieren en de ontwikkeling van het beengestel. Daarnaast zorgen ze ook voor waardevolle melk.

Hoeveelheid voer

Hoeveel voer de merrie precies nodig heeft is o.a. afhankelijk van haar maat, hoeveelheid dagelijkse beweging en type. Maar let er vooral op dat ze niet te mager wordt, want dan kan ze na de bevalling niet voldoende melk geven. Enige reserves zullen na de bevalling hard nodig zijn.

Ook na de dracht is het belangrijk dat ze genoeg krachtvoer binnenkrijgt. De merries stoppen dan veel energie in de melkgift en hebben extra brok nodig. Anders raken ze in een negatieve energiebalans. Je ziet vaak dat ze dan erg snel vermageren, probeer dit te voorkomen door al de eerste dag na de bevalling veel brok te voeren. Geef altijd voldoende ruwvoer (kuil of hooi van goede kwaliteit). Eigenlijk moet ze altijd wat ruwvoer tot haar beschikking hebben. Dit houdt haar spijsvertering op gang en daarmee verklein je de kans op koliek maar ook op verving en stress of onrust.

Succes met de fokkerij!

Esther Verhees
 HAVENS Voeders

