

Brede toelating Fusilade Max[®]

In onderstaande teelten is Fusilade Max[®] toegelaten. Lees voor toepassing altijd het etiket.

| Toepassingsgebied | Type toepassing | Dosering | Max. aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Veiligheids-termijn in dagen |
|---|--------------------|----------|--|------------------------------|
| Aardappel | Na opkomst | 1-2 l/ha | 1 per teeltcyclus | 75 |
| Bieten | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per teeltcyclus | 56 |
| Peulvruchten | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per teeltcyclus | 90 |
| Roodzwenkgras | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per 12 maanden | 49 |
| Hardzwenkgras | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per 12 maanden | 49 |
| Blauwmaanzaad | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per teeltcyclus | - |
| Karwij | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per teeltcyclus | - |
| Koolzaad | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per teeltcyclus | - |
| Veldbonen (voor ensilage) | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per teeltcyclus | 90 |
| Cichorei | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per teeltcyclus | 56 |
| Witlof (pennenteelt) | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per teeltcyclus | 56 |
| Appel | Strokenbehandeling | 1-3 l/ha | 1 per 12 maanden | 28 |
| Peer | Strokenbehandeling | 1-3 l/ha | 1 per 12 maanden | 28 |
| Kers (onbedekte teelt) | Strokenbehandeling | 1-3 l/ha | 1 per 12 maanden | 28 |
| Pruim (onbedekte teelt) | Strokenbehandeling | 1-3 l/ha | 1 per 12 maanden | 28 |
| Aardbei (onbedekte teelt) | Over het gewas | 1-3 l/ha | 1 per teeltcyclus | 42 |
| Aalbes (onbedekte teelt) | Tussen het gewas | 1-3 l/ha | 1 per 12 maanden | 90 |
| Kruisbes | Tussen het gewas | 1-3 l/ha | 1 per 12 maanden | 90 |
| Braam- en framboosachtigen (<i>Rubus spp.</i>) (onbedekte teelt) | Tussen het gewas | 1-3 l/ha | 1 per 12 maanden | 45 |
| Boon met peul (onbedekte teelt) | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per teeltcyclus | 56 |
| Erwt zonder peul | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per teeltcyclus | 56 |
| Wortelen | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per teeltcyclus | 56 |
| Koolraap | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per teeltcyclus | 56 |
| Rode biet | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per teeltcyclus | 56 |
| Knolselderij (onbedekte teelt) | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per teeltcyclus | 56 |
| Schorseneer | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per teeltcyclus | 56 |
| Uien | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per teeltcyclus | 28 |
| Sjalotten | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per teeltcyclus | 28 |
| Asperge (onbedekte teelt) | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per teeltcyclus | - |
| Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulpen (onbedekte teelt) | Na opkomst | 1-3 l/ha | 1 per teeltcyclus | - |
| Boomkwekerij-gewassen (onbedekte teelt)* | Over het gewas | 1-3 l/ha | 1 per 12 maanden | - |
| Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)* | Over het gewas | 1-3 l/ha | 1 per 12 maanden | - |
| Houtige beplanting* | Over het gewas | 1-3 l/ha | 1 per 12 maanden | - |
| Akkerranden | Over het gewas | 1-3 l/ha | 1 per 12 maanden | - |

***Aandacht in sierteelt, boomkwekerijgewassen en beplantingen**

Wij adviseren in nieuwe rassen van sierteelten altijd eerst een proefbespuiting uit te voeren. In een aantal boomkwekerijgewassen en beplantingen heeft Fusilade Max[®] in het verleden gewasreacties veroorzaakt. Vraag daarom bij deze teelten altijd deskundig advies van uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen.

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel

+31 (0)10 303 77 00
info.nl@nufarm.com
nufarm.com/nl